Speciális betegtájékoztató szempontjai műtéthez, illetve fokozott kockázattal járó beavatkozáshoz, kezelési eljáráshoz

Beteg neve...: TAJ.....:
Lánykori név.: Szül.dátum...:
Anyja neve...: Felv. dátum..:

Tisztelt Betegünk!

Az Ön betegsége: Középidös vetélés (12-24. hét között).
Lehetséges gyógymódok: Oxytocin infusio használata középidös vetélés elősegítésében.
WHOkód: 57525.

A javasolt beavatkozás lényege: A középidős vetélés megindítása Rivanol, illetve prostaglandinnal történhet, majd a vetélés idejének lerövidítése céljából Oxytocin (fájáskeltő) infusiot alkalmazhatunk.

Alkalmazási mód: infusio
ban 500 ml Ringerben egy ampulla (5 NE) Oxytocin. infusomatban 50 ml/egy ampulla (5 NE) Oxytocin.

A beavatkozás előnyei: A vetélés lezajlása, amely átlagosan 24-30 óra alatt történhet, ezzel a módszerrel az időintervallumot jelentősen lerövidíthetjük.

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: A vetélés időben történő jelentős elhúzódása.

A javasolt beavatkozás kockázatai: Vérnyomáscsökkenés, szívritmuszavar, hányinger, hányás.

Lehetséges alternatív megoldások: A vetél
és megindítása prostaglandinok
alkalmazásával, Rivanol feltöltéssel.

A műtét során felmerülhet:

Tájékoztatjuk, hogy a javasolt beavatkozást jogában áll visszautasítani, de ennek következményei Önt terhelik.
A fenti tájékoztatót elolvastam, az eljárásról és annak lehetséges szövődményéről kellő felvilágosítást kaptam. További kérdésem nincs.

A beavatkozás elvégzésébe(aláhúzandó):
beleegyezem nem egyezem bele*

....
tájékoztatást adó orvos aláírása, pecsét aláírás(beteg,v.törv.képviselő

*Tanúk:

....
név név

....
lakcím lakcím